

<p>Score 1 (1-3 mm) Beslissingsmoment Overwegingen</p>	<p>Score 2 (4-5 mm) Beslissingsmoment Overwegingen</p>	<p>Score 3 (≥ 6 mm) Beslissingsmoment Overwegingen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Is er sprake van veel plaque? • Is er sprake van veel bloeding? • Is er sprake van tandsteen? • Is er sprake van aanslag? • Is er sprake van plaqueretentiefactoren? 	<ul style="list-style-type: none"> • Is er sprake van veel plaque? • Is er sprake van veel bloeding? • Is er sprake van tandsteen? • Is er sprake van aanslag? • Is er sprake van plaqueretentiefactoren? • Is er sprake van pseudopockets? • Is er sprake van gevorderd aanhechtingsverlies (bijv. recessie vooral interdentaal) • Zijn er furcatieproblemen? • Zijn er risicofactoren met betrekking tot de algemene gezondheid van de patiënt (bijv. niet goed gereguleerde diabetes)? • Is er sprake van factoren van ongezond gedrag (bijv. roken, stress, overgewicht)? • Zijn er risicofactoren met betrekking tot de algemene gezondheid van de patiënt (bijv. niet goed gereguleerde diabetes)? • Is er sprake van factoren van ongezond gedrag (bijv. roken, stress, overgewicht)? 	<ul style="list-style-type: none"> • Is er sprake van pseudopockets? • Is er sprake van gevorderd aanhechtingsverlies (bijv. recessie vooral interdentaal) • Zijn er furcatieproblemen? • Zijn er risicofactoren met betrekking tot de algemene gezondheid van de patiënt (bijv. niet goed gereguleerde diabetes)? • Is er sprake van factoren van ongezond gedrag (bijv. roken, stress, overgewicht)? • Is er mogelijk sprake van een gecombineerde endodontische en parodontale problematiek? • Is er sprake van een geïmpacteerd buurelement? • Is er verdenking op een fractuur of eerdere iatrogene restauratieve behandeling?
<p>Een aspect dat niet in een richtlijn lijkt te vatten is het meenemen van de leeftijd van de patiënt in de overweging. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van pockets ≥ 6 mm op 18-jarige leeftijd duidt op een hogere gevoeligheid voor parodontale problemen dan bijvoorbeeld eenzelfde beeld bij een 67-jarige. De jonge patiënt wordt mogelijk eerder verwezen en de oudere zal een lagere frequentie van nazorg nodig hebben, nadat de parodontale problemen zijn behandeld.</p>		

Disclaimer: Deze samenvatting dient als ondersteuning bij de drie beslissingsmomenten, maar moet niet gezien worden als een complete lijst. Deze kan namelijk niet alle aspecten bevatten die bij de individuele patiënt in overweging genomen kunnen of moeten worden.